

**Comunicato n. 04/19 Fiorello Terzariol del 14/05/2019**

**VITE: primi riscontri della Peronospora primaria.**

**Meteo:** è continuato anche nell'ultimo periodo l'andamento meteo caratterizzato da elevata variabilità con frequenti e intense piovosità, accompagnate da valori termici piuttosto contenuti per il periodo (medie 10-15°C).

**Fenologia:** Le condizioni meteo avverse determinano un andamento fenologico rallentato, con le cultivar che variano da un decimetro di germoglio a grappoli con bottoni fiorali separati.

**Patologie:** Dal lato fitosanitario cominciano ad evidenziarsi le prime macchie della **Peronospora** primaria, derivanti dalle infezioni nate con le piogge iniziate il 23 di aprile.

Le difficoltà che si stanno riscontrando nell'eseguire i trattamenti fitosanitari, dovuti alle continue piovosità e molte volte alla impraticabilità dei terreni, stanno determinando un avvio dell'annata viticola piuttosto preoccupante.

Gli interventi consigliati da eseguire appena il tempo lo permette (finestra meteo), possono far riferimento all'impiego di prodotti **endoterapici citotropici Fluopicolide, Mandipropamide, Valifenalate, Dimetomorf, Iprovalicarb, Bentiavalicarb, Ciazofamide, Pyraclostrobin, Fenamidone, Famoxadone, Oxathiapiprolin ..e Cymoxanil,**  
o con **sistemici (Metalaxil, Metalaxil-M, Benalaxil, Benalaxil-M, Fosetil di alluminio... e Fosfonato di potassio o di disodio).**

Contro l' **Oidio** si ricorda di abbinare agli antiperonosporici endoterapici, **antioidici** con pari durata di protezione, tipo **Triazoli o I.B.S., Spiroxamina, Cyflufenamide, Trifloxystrobin, Difenconazolo, Fenbuconazolo, Fluxapyroxad...**

Per le aziende che continuano ad operare con linee di difesa antiperonosporica di **Superficie (Metiram, Mancozeb, Propineb, Folpet, Ditanon, Rameici.. Olio essenziale di arancio dolce...Cerevisane)**, rimangono le attenzioni e gli accorgimenti più volte riportati: calendario di copertura attorno ai 7 giorni e il ripristino immediato dopo eventuali dilavamenti (attenzione al cambio del prodotto commerciale se non rispettato l'intervallo da etichetta!!!).

In questo caso la difesa antioidica potrà avvalersi dell'utilizzo dello **Zolfo micronizzato.**

**Attenzione ai divieti sull'uso di determinate sostanze attive riportati nei Regolamenti comunali di polizia rurale e/o sconsigliati dai Protocolli/Vademecum viticoli.**