

VITE – INIZIO VEGETATIVO 2013

Il primo **germogliamento** 2013 è iniziato (gemma mossa o gonfia, punta verde... germoglio di 2-3 cm) in questi ultimi giorni (metà aprile), anche se con un ritardo di quasi 3 settimane rispetto al 2012, tutto ciò dovuto all'andamento freddo e piovoso del primo trimestre e della prima parte di aprile di questa annata 2013.

VITE: nei vigneti che negli ultimi anni hanno **evidenziato la presenza** del fungo dell' **Escoriosi** (*Phomopsis viticola*) e visto l'andamento piovoso sopra descritto, si consiglia di intervenire (si ribadisce, solo se tale manifestazione sia stata precedentemente riscontrata nel vigneto) con prodotti a base di **Ditiocarbammati** (in particolare Mancozeb), ripetendo il trattamento dopo 8 – 10 giorni.

Negli ambienti dove vigono regolamenti e/o protocolli più restrittivi nell'uso dei prodotti fitosanitari, si potrà intervenire preventivamente contro l'**Escoriosi** e contro l'**Oidio**, con lo **Zolfo bagnabile**.

Manifestazioni da Escoriosi della Vite



INDICAZIONI FITOSANITARIE: si ricorda di **NON** effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari (in particolare insetticidi), durante la fase di **fioritura** delle colture (attualmente Ciliegio, Melo..); questo per la salvaguardia e la tutela degli insetti pronubi (**api**).

Fiorello Terzariol